OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

42,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY

DIXIÈME FASCICULE

(30 octobre 1914)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1914

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Le présent fascicule pourrait paraître encadré de noir, car il se publie à une époque lugubre, remplie de deuils cruels et de pertes irréparables. Dans la sombre tristesse et les pénibles angoisses que nous traversons, devant les ruines qui s'amoncellent, la science commande à la mort, plus résistante que les murailles historiques qui s'écroulent sapées par un orgueil irréfléchi qu'a dirigé une déconcertante mentalité : elle survole la désolation, conserve toute sa vitalité pour l'avenir. La force brutale peut incendier les ouvrages réputés sans les rendre périssables ; qu'on le veuille ou non, la science survivra aux destructeurs et, sur les décombres fumants des bibliothèques stupidement détruites, sa puissance inviolée continuera son impérissable règne de domination mondiale.

Puisse le triomphe définitif de la science, sous les lois de la justice sacrée, ne pas tarder trop à éclairer de sa splendeur surhumaine notre malheureux horizon endeuillé !

Ces réflexions, non superflues, faites, je vais me permettre d'écrire encore quelques lignes d'explication ou d'excuse, chacun prendra le terme qui lui conviendra le mieux, avant de passer à la partie descriptive.

Peut-être certains collègues s'étonneront-ils que je fasse paraître un fascicule au moment d'une époque fort troublée où il semble que la publication de quelques descriptions doive être le dernier souci de tout entomologiste sérieux et patriote. Je l'ai fait pour donner du travail à des ouvriers que le chômage forcé privait de ressources ; je l'ai fait parce

que je suis toujours en avance de copies et qu'ainsi j'ai pu composer un nouveau fascicule sans distraire beaucoup de ce temps aujourd'hui presque uniquement consacré partout à la noble cause humanitaire.

Ce fascicule imprimé en octobre attendra des jours meilleurs pour être distribué partout, car pour l'instant quelques-uns seulement de mes correspondants sont à même de pouvoir le recevoir.

Nota. — Toutes les espèces ou variétés décrites dans le présent fascicule font partie de ma collection.

1er octobre 1914.

UN NOUVEAU GENRE DE MALACODERMES

Photurocantharis n. gen. *Discodon* Gorh. vicinus, sed thorace antice valde arcuato, supra capite ad medium satis prominulo ; capite antice elongato ; elytris latis et deplanatis, infra humeros excavatis ; pedibus brevibus, tibiis anticis arcuatis aut subarcuatis, articulis penultimis tarsarum longe fissis ; articulo 5° abdominis in medio pallido notato.

Ce nouveau genre, que je place provisoirement près du genre *Discodon* Gorh. (1), est surtout caractérisé par la forme particulière du prothorax qui s'avance en son milieu antérieur sur la tête qu'il cache en partie, cette structure prothoracique le fait ressembler aux représentants du genre *Photuris* Lec. Il semble se distinguer de ce dernier genre au moins par la tête assez rostrifère et les antennes insérées plus antérieurement. Comme autres caractères du genre faciles à voir, nous avons celui du 4e article des tarses qui, en étant très longuement entaillé au milieu, se présente sous forme de lobes longs et étroits, et la tâche pâle (peut être lumineuse à l'état vivant) du 5e segment abdominal. Les quatre espèces caractéristiques du genre qui me sont connues ont toutes les élytres larges et relativement courts et ces organes sont plus ou moins nettement creusés sur les côtés antérieurs en dessous des épaules. Une 5e espèce (*diversipes*) douteuse, et qui pourrait être placée plutôt dans les *Photuris* Lec., a ses tarses courtement entaillés et la tête un peu moins cachée par le prothorax avec les antennes insérées plus haut, vers le milieu des yeux.

(1) Avant sa mort, notre regretté collègue et ami E. Olivier a vu quelques représentants de ce genre que je croyais être des *Photuris* Lec. ; il les a retournés innommés avec l'étiquette déterminative suivante : *Telephoridæ*. Je m'appuie sur cette opinion du spécialiste réputé pour ne pas les ranger dans les *Lampyridæ*.

Photurocantharis maculicollis n. sp. Nitidus, niger, elytris subviolaceis, capite antice rubro, thorace lateraliter rubro maculato.

Brillant, noir avec les élytres un peu violacés, devant de la tête roux, prothorax orné, de chaque côté, d'une macule rouge allongée, celui-ci inégal en dessus ; élytres modérément ruguleux. Long. 10 mill. Pérou et Bolivie.

Photurocantharis nitidipennis n. sp. Nitidus, testaceus, oculis, abdomine tarsisque nigris, elytris subviolaceis.

Brillant, testacé avec les yeux, l'abdomen, les tarses noirs, élytres un peu violacés ; prothorax très transversal, un peu inégal en dessus ; élytres plus ou moins ruguleux. Long. 12 mill. Bolivie.

Varie par les genoux tachés de noir et les tibias en partie foncés, **v. nov. peruvianus**, du Pérou.

Photurocantharis opacipennis n. sp. Fere opacus, testaceus, antennis, capite inter oculos, abdomine, tibiis pro parte tarsisque nigris, elytris nigris, griseo pubescentibus.

Presque opaque, testacé avec les antennes, le milieu de la tête entre les yeux, l'abdomen, partie des tibias et tarses noirs ; élytres noirs à reflets grisâtres ; prothorax peu transversal, non inégal sur le disque ; élytres à ponctuation granuleuse, dense. Long. 12 mill. Bolivie.

Photurocantharis atripes n. sp., Subnitidus, elytris opacis, niger, capite pro parte, thorace coxisque testaceis.

Un peu brillant avec les élytres opaques, tête, celle-ci obscurcie entre les yeux et sur le labre, prothorax et hanches testacés, partie des cuisses antérieures en dessous vaguement roussâtre ; prothorax transversal, un peu inégal sur le disque ; élytres à ponctuation granuleuse, très dense, peu distinctement pubescents. Long. 10 mill. Pérou.

? **Photurocantharis diversipes** n. sp. Subnitidus, niger, thorace, scutello femoribusque pallidis, elytris brunnescentibus.

Un peu brillant, noir avec les élytres rembrunis, le prothorax, l'écusson et les cuisses d'un testacé flave ; tête courte, yeux très gros ; prothorax en demi-cercle, presque lisse, un peu bombé au milieu ; élytres longuement pubescents de gris, nettement rétrécis vers les épaules, à ponctuation ruguleuse, forte avec de vagues traces de côtes discales. Long. 9 mill. Brésil.

Ces différentes espèces pourront se reconnaître facilement à l'aide du synopsis suivant :

1 Pénultième article des tarses longuement lobé, antennes insérées presque devant les yeux [genre *Photurocantharis* Pic] ; élytres foncés, non, ou à peine, rétrécis devant les épaules. 2

1′ Pénultième article des tarses brièvement lobé, antennes insérées presque au milieu des yeux [peut-être in genre *Photuris* Lec.] ; élytres brunâtres, nettement rétrécis à la base devant les épaules. **diversipes** Pic.

2 Prothorax concolore, testacé. 3

2′ Prothorax noir, maculé de rouge de chaque côté. **maculicollis** Pic.

3 Elytres mats ; prothorax subopaque ou à peine brillant ; antennes noires. 4

3′ Elytres brillants ; prothorax brillant et plus transversal ; antennes testacées. Varie par l'aspect un peu plus brillant et les pattes en partie foncées (*v. peruvianus* Pic). **nitidipennis** Pic.

4 Ecusson testacé et pattes en majeure partie testacées ; élytres d'un noir gris. **opacipennis** Pic.

4′ Ecusson noir et pattes en majeure partie noires ; élytres franchement noirs. **atripes** Pic.

Etude dichotomique des Hypaspistes Wat. d'Afrique

Le genre *Hypaspistes* Water. a été établi pour une espèce de Ceylan qui ne m'est connue que par la description, il a pour synonyme *Pristocyphus* Fairm.

Ce genre, voisin de *Notoxus* Geofr., est très facile à reconnaître par la corne de son prothorax qui est longue et munie latéralement de plusieurs dentelures saillantes ainsi que par ses tarses grêles, ses antennes à 1er article très long, enfin par son prothorax muni d'un petit étranglement près de la base.

1 Prothorax sans ligne médiane lisse, avec les côtés modérément, ou courtement, pubescents. 2

1′ Prothorax orné d'une ligne médiane lisse avec les côtés voilés par une pubescence dense et longue. Long. 7 mill. Zambèse. **Brancsiki** Pic.

2 Elytres à pubescence non squamuleuse mais simple, longue et plus ou moins espacée. 4

2′ Elytres à pubescence squamuleuse, avec seulement quelques poils redressés bien visibles sur leur base. 3

3 Epaules un peu obliques, élytres fortement acuminés en pointe à l'angle sutural. Long. 5-5,5 mill. Madagascar. **Perrieri** Frm.

3′ Epaules droites, élytres à angles suturaux simplement un peu saillants. Long. 5 mill. environ. Zambèse. **latipennis** Pic.

4 Prothorax entièrement testacé, moins les granules de la corne foncées ; élytres à sommet testacé. 5

4′ Prothorax en partie foncé ; élytres à sommet, sauf parfois la bordure apicale qui reste plus claire, foncé. Long. 3,5-4 mill. Afrique orientale allemande. **maculipennis** Pic.

5 Suture élytrale brune au moins en partie ; élytres ayant parfois une large macule suturale brune. 6

5′ Suture élytrale testacée comme le reste de ces organes. Long. 3,8-4 mill. Madagascar. **Bouvieri** Pic.

Corne prothoracique à sommet subarqué (*Bouvieri* Pic), ou tronqué (*angusticollis* Frm.) (1).

6 Elytres à suture brune, ou brièvement marquée de brun sur cette partie. Long. 4-5 mill. Erythrée, Soudan, Zambèze. **suturalis** Pic.

6' Elytres ornés d'une macule brune suturale plus ou moins large. Soudan (coll. Pic).
suturalis *var. nov.* **brunneonotatus.**

Nouveaux Coléoptères de diverses familles

Cladotoma vittata n. sp. Niger, supra luteo pubescens, in elytris pro parte lineatis, infra albo pubescens, femoribus testaceis.

Noir avec les cuisses, moins leur sommet, testacées, dessous densément pubescent de blanc et dessus pubescent de jaune, densément sur l'avant-corps et l'écusson, moins densément sur les élytres qui ont sur le disque des places en partie glabres alternées avec des bandes pubescentes et ainsi très distinct de *C. ovalis* Westw. et des autres espèces. Long. 14 mill. Indes.

Eubrianax obscuripes n. sp. Satis elongatus, postice dilatatus, niger, thorace antice et lateraliter albo limbato.

Voisin de *C. pellucidus* Lewis, bien distinct par sa forme plus allongée et la coloration foncée de ses pattes. Long. 4 mill, Indes.

Stagetomorphus nov. genus. *Stagetus* Wol. vicinus sed scutello maximo, thorace amplo, lateraliter et postice distincte explanato.

(1) Je n'ai pas cette espèce sous les yeux pour en parler autrement ici ; il se pourrait que *Bouvieri* Pic ne s'en distingue pas spécifiquement.

Ce genre nouveau offre, en outre des principaux caractères ci-dessus, une forme courte et trapue avec les épaules saillantes, les élytres sont striés, plus fortement sur les côtés et marqués d'une carène transversale sous les épaules.

Stagetomorphus indicus n. sp. Brevis et latus, nitidus, griseo pilosus, nigro-piceus, antennis pedibusque testaceis.

Court et large, brillant, orné de poils gris plus ou moins longs et en partie redressés, noir de poix, plus obscur par places, antennes et pattes testacées. Tête grande ; antennes à dernier article très long ; prothorax très transversal et court, peu rétréci en avant, à ponctuation fine, un peu écartée ; écusson grand ; élytres courts et larges, à stries ponctuées, les discales étroites, les externes larges et plus profondes, intervalles sur le dessus larges, pas de strie raccourcie derrière l'écusson. Long. 2-2,3 mill. Indes : Mahé.

Mesocœlopus indicus n. sp. Latus et brevis, convexus, nitidus, griseo aut luteo pubescens, niger, elytris postice rufescentibus, pedibus testaceis.

Large et court, atténué postérieurement, convexe, brillant, revêtu d'une pubescence soyeuse, couchée, rapprochée, grise ou jaunâtre, noir, sommet des élytres roussâtre, pattes testacées. Tête large ; prothorax court et très transversal, subarqué sur les côtés, fortement sinué postérieurement, finement ponctué avec quelques points épars plus gros ; élytres courts, atténués postérieurement, finement ponctués. Long. 2 mill. Indes : Mahé.

Voisin de *M. sumatrensis* Pic, plus large avec la pubescence plus rapprochée sur les élytres, la tête foncée, etc.

Ptinus amazonicus n. sp. Satis latus, niger, tibiis pro parte elytrisque apice rufescentibus ; thorace in disco albo lineato ; scutello albido ; elytris albo bifasciatis, fasciis sinuatis.

Assez large, noir, tibias en partie et sommet des élytres

roussâtres, deux fascies ondulées sur les élytres et une ligne longitudinale médiane sur le prothorax blanches, écusson allongé, pubescent de blanc. Tête grosse ; antennes foncées, assez robustes ; prothorax fortement dilaté sur les côtés au milieu, sillonné sur le milieu en dessus avec 4 saillies émoussées, élargi sur la base en arrière ; élytres courts et larges, à épaules très marquées. finement strié-ponctués, à intervalles larges, ces organes sont ornés, avant et en dessous de leur milieu, de deux étroites fascies blanches, sinuées qui se dirigent obliquement l'une vers l'autre du côté de la suture, base et sommet à peine mouchetés de blanc. Long. 3 mill. Amérique Méridionale : Ega sur l'Amazone.

Voisin de *P. Grouvellei* Pic, mais fascies élytrales différentes, prothorax à ligne blanche nette, etc.

Ptinus inapicalis v. nov. luteohirtus. Thorace longe luteo piloso.

Distinct, à première vue, de la forme type par le prothorax à saillies médianes moins élevées et orné de longs poils dressés, ceux-ci presque entièrement jaunes. Long. 3 mill. Brésil : Bahia.

Ototreta debilis v. nov. Holzi. Niger, thorace (antice in medio vage brunnescente) scutelloque testaceis, femoribus pro parte rufescentibus, elytris nigris, antice et mediocre testaceo cinctis.

Diffère de la forme type (ex description) par la bordure claire des élytres antérieure seulement et par le prothorax presque entièrement testacé. Long. 6 mill. Sumatra (Holz).

Ototreta impustulata n. sp. Satis latus, nitidus, niger, infra corpore pro parte piceo, thorace lateraliter rufo-cincto.

Assez large, brillant, noir avec le dessus du corps en partie noir de poix, prothorax étroitement bordé de roux sur les côtés. Tête assez large ; antennes noires, longues, robustes ; prothorax large, peu arqué en avant, sillonné au milieu, presque lisse ; écusson long ; élytres subovalaires,

assez larges, à ponctuation ruguleuse, forte et dense ; pattes robustes, foncées, avec les cuisses un peu rembrunies. Long. 4,5 mill. Tonkin : Bao-Lac.

Voisin de *O. bipustulata* Ol. et distinct, à première vue, par les élytres entièrement noirs, ainsi que par la forme plus ovalaire.

Flabellotreta ruficeps n. sp. Oblongo-ovalis, subnitidus, rufo-testaceus, oculis, articulis 3 et sequentibus antennarum, tibiis tarsisque nigris ; elytris nigris, ad humeros breve rufo et apice breve testaceo maculatis.

Oblong-ovalaire, peu brillant, pubescent de gris, testacé-roussâtre avec les yeux, les antennes moins les deux premiers articles, les tibias, les tarses et la majeure partie des élytres noirs, ces derniers organes sont brièvement maculés de roux aux épaules et de testacé au sommet. Tête petite ; antennes à articles 3 et suivants aplatis et longuement flabellés ; prothorax transversal, subarqué sur les côtés antérieurement, sinué postérieurement, à angles postérieurs assez saillants, incisés en dessus ; élytres subovalaires, de la largeur du prothorax à la base, un peu atténués au sommet, fortement ponctués avec des côtes discales ; pattes assez robustes. Long. 7 mill. Bornéo : Brunei.

Voisin de *F. obscuriceps* Pic, très distinct par sa coloration et la forme différente.

Flabellotreta malabarensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris postice in disco brunneo notatis.

Assez allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, testacé sauf les yeux noirs et les élytres teintés de brun sur environ leur moitié postérieure, bords exceptés. Tête presque de la largeur du prothorax, biimpressionnée entre les yeux ; antennes épaisses et larges, à 2e article court, 3e et suivants courtement flabellés ; prothorax très transversal, subarqué sur les côtés antérieurs, sinué postérieurement, à angles postérieurs peu marqués, incisés en dessus ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, nettement atténués postérieurement, à ponctuation

médiocre, ruguleuse ; pattes robustes avec les tibias plus ou moins sillonnés : Long. 7 mill. Indes : Malabar.

Cette espèce, très distincte dans le genre par sa forme jointe à sa coloration, ressemble à certains *Selasia* Cast., mais la structure prothoracique et celle des antennes l'en distinguent à première vue.

Selasia grandis n. sp. Modice elongatus, nitidus, testaceus, oculis et mandibulis apice nigris, elytris testaceis, ad medium in disco nigro notatis.

Modérément allongé, brillant, orné d'une pubescence jaune espacée, testacé avec les yeux et le sommet des mandibules noirs, élytres testacés, ornés d'une macule noire allongée, celle-ci discale seulement, plus éloignée de la base que du sommet. Tête munie d'une fossette frontale ; antennes flabellées à partir du 3e article, 2e court, non anguleux ; prothorax très transversal, nettement échancré devant l'écusson, presque droit sur les côtés avec les angles postérieurs larges et peu saillants, à ponctuation moyenne, écartée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, relativement longs, subparallèles, à ponctuation moyenne, assez écartée, avec, sur le disque, des traces de stries irrégulières et incomplètes. Long. 12 mill. Congo.

Voisin de *S. Robecchii* Gestro (ex description), en différant au moins par les élytres à macule noire réduite et la taille plus avantageuse.

Selasia sibutensis n. sp. Satis latus, nitidus, testaceus, oculis elytrisque apice late nigris, antennis brunneis, ad basin testaceis.

Assez large, brillant, orné d'une pubescence jaune, espacée, testacé avec les yeux et un peu plus du tiers apical des élytres noirs, la coloration noire remontant davantage sur les côtés que sur la suture, antennes brunes, au moins sur les rameaux avec les premiers articles testacés, le 3e étant très longuement denté et un peu arqué. Tête largement impressionnée entre les yeux, à ponctuation forte, très écartée ; prothorax transversal, subsinué sur les côtés avec les angles postérieurs très saillants, à ponctuation très espacée ; ély-

tres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, nettement rebordés, éparsément ponctués avec des traces de stries discales, en outre d'une suturale très marquée. Long. 7 mill. Congo : Fort Sibut.

Paraît voisin de *S. pulchella* Gestro, qui ne m'est pas connu en nature, et semble en différer par la coloration des antennes et celle des élytres.

Selasia apicalis n. sp. Modice elongatus, nitidus, testaceus, antennis pedibusque pro parte nigro-piceis, elytris apice late nigris.

Modérément allongé, brillant, orné d'une longue pubescence jaunâtre, testacé avec les yeux rembrunis, les antennes et les pattes en majeure partie obscurcies (1er article des antennes et cuisses vaguement roussâtres), élytres ayant un peu plus du tiers apical noir, cette dernière coloration à contours irréguliers en avant. Tête large, impressionnée entre les yeux ; antennes à premier article subsillonné, 2e court, non dilaté, 3e courtement, 4e et suivants longuement flabellés ; prothorax transversal, sinué et étroitement explané sur les côtés, à angles postérieurs peu saillants ; élytres plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles, marqués de nombreuses stries peu profondes. Long. 5,5 mill. Ceylan.

Voisin de l'espèce précédente, forme élytrale un peu moins large, prothorax nettement explané sur les côtés, antennes différentes, etc.

Selasia atriventris n. sp. Modice elongatus, nitidus, testaceus, oculis abdomineque nigris.

Modérément allongé, brillant, orné d'une longue pubescence jaunâtre, testacé, avec les yeux et l'abdomen noirs, poitrine en partie rembrunie. Tête assez large, impressionnée, antennes à 2e article court et large, 3e longuement pectiné, 4e et suivants flabellés ; prothorax transversal, subsinué sur les côtés, à angles postérieurs peu saillants ; élytres plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, faiblement et irrégulièrement striés. Long. 6 mill. Indes : Darjeeling.

Très distinct du précédent par sa coloratton et son prothorax proportionnellement moins large.

Phrixothrix javanus n. sp. Minutus, nitidus, testaceus, oculis elytrisque nigris, antennis brunnescentibus.

Petit, brillant, orné de poils dressés en partie clairs, testacé, yeux et élytres noirs, antennes brunâtres. Tête large, à ponctuation très grosse, rapprochée ; antennes assez courtes, à 2e article large, 3e et suivants biflabellés ; prothorax très transversal, presque droit sur les côtés, sinué postérieurement, en partie et fortement ponctué ; élytres plus larges que le prothorax, pas très longs, atténués et déhiscents au sommet, assez ruguleux ; ailes noirâtres, couvrant l'abdomen ; pattes peu épaisses. Long. 4 mill. Java.

Espèce très distincte par sa petite taille jointe à sa coloration.

Discodon meridanum n. sp. Satis elongatus, subnitidus, testaceo pallidus, capite brunnescente, antennis, tarsis abdomineque pro parte nigris.

Assez allongé, un peu brillant, testacé pâle, la tête étant rembrunie avec les antennes et les tarses noirs. Tête de la largeur du prothorax, plus ou moins rembrunie avec les côtés en dessous des antennes, testacés ; antennes courtes, plus grêles au sommet ; prothorax transversal, subarqué en avant, lisse, de coloration un peu plus pâle que celle des élytres, subsinué sur les côtés en arrière ; élytres à peu près de la largeur du prothorax, longs, subparallèles, ruguleusement ponctués ; pattes moyennes. Long. 10-10,5 mill. Vénézuela : Mérida.

Voisin de *D. flavicolle* Gorh. et distinct, à première vue, par sa coloration plus claire.

Discodon brevetestaceum n. sp. Parum elongatus, subnitidus, niger, capite pro parte, thorace lateraliter, femoribus pro parte, abdomine apice humerisque testaceis.

Peu allongé, subparallèle, un peu brillant, noir avec la tête, celle-ci largement marquée de noir sur le vertex, les

côtés du prothorax assez largement, le dessous des cuisses plus ou moins, le sommet de l'abdomen et les épaules testacés. Tête un peu moins large que le prothorax ; prothorax pas très large, subarqué en avant, faiblement sinué sur les côtés, presque lisse ; élytres de la largeur du prothorax, faiblement élargis en dessous du milieu et rétrécis plus bas, à ponctuation granuleuse, sans côtes distinctes, noirs avec une macule humérale allongée testacée ; pattes peu épaisses, bicolores. Long. 8 mill. Brésil.

Voisin de *D. vitticolle* Gorh., prothorax plus rétréci en avant, plus largement marqué de noir au milieu, élytres de coloration différente, etc.

Discodon inplicatum n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace et antennis ad apicem testaceis.

Peu allongé, subparallèle, brillant, noir avec le prothorax et les derniers articles des antennes testacés. Tête un peu moins large que le prothorax, noire avec les mandibules et partie de la bouche testacées ; antennes courtes, atténuées à l'extrémité ; prothorax très transversal, sinué sur les côtés, presque lisse ; élytres peu plus larges que le prothorax, un peu élargis vers le milieu et rétrécis plus bas, finement granuleux ; pattes grêles, foncées. Long. 7-7,3 mill. Brésil.

Voisin de *D. plicatum* Gorh. mais prothorax sans macule noire, élytres moins grossièrement ruguleux et antennes testacées à l'extrémité.

Discodon bifossicolle n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis et pedibus pro majore parte abdomineque nigris, elytris violaceis, capite postice thoraceque in disco breve nigro notatis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise espacée, roux-testacé avec les antennes (1ers et derniers articles au moins en partie roux), tibias au moins en dessus, tarses, dessous du corps et écusson noirs, élytres métalliques, violacés, tête postérieurement et prothorax au milieu brièvement maculés de foncé. Antennes assez épaisses, atténuées et plus claires au sommet ; prothorax subtransversal, lar-

gement impressionné de chaque côté près des angles antérieurs, longuement cilié sur les côtés vers les angles postérieurs, subsinué sur les côtés ; élytres de la largeur du prothorax, subparallèles, fortement rugueux. Long. 9 mill. Pérou.

A placer près de *D. maximicorne* Pic, antennes plus minces, prothorax différent, etc.

Discodon testaceicorne n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, thorace et femoribus anticis pro parte rufo-testaceis, antennis testaceis.

Allongé, brillant, peu distinctement pubescent de gris, noir avec les cuisses antérieures tachées de roux, la tête (celle-ci maculée de noir sur le vertex) et le prothorax d'un roux testacé, ce dernier avec une étroite bande médiane noire qui s'étend en avant sur une partie du bord antérieur, antennes testacées avec le 1er article rembruni. Long. 11 mill. Pérou.

Très voisin du précédent par sa forme, mais, en outre de la coloration différente de certains organes, entre autres celle des antennes, le protborax est faiblement impressionné sur les côtés, les élytres, de coloration noire, sont moins ruguleux, etc.

Hapalochrus luzonensis n. sp. ♂. Metallicus, viridis, elytris cæruleis, pedibus testaceis, antennis flabellatis, nigris, ad basin testaceis.

Peu allongé, brillant, pubescent de gris avec des poils dressés, ponctuation plus forte et plus dense sur la tête, fine et irrégulière sur les élytres, d'un vert métallique sur l'avant-corps et l'écusson, bleuâtre sur les élytres, base des antennes, celles-ci flabellées, et pattes testacées, ces dernières avec les tibias antérieurs sinués et un peu élargis vers le milieu interne, les quatre autres épaissies et un peu creusées. Long. 5 mill., Luzon.

Par ses antennes flabellées peut prendre place près de *H. Simoni* Pic, dont il diffère par la forme moins allongée, la coloration, etc.

Hapalochrus testaceicornis n. sp. ♂. Satis elon-

gatus, nitidus, viridi-metallicus, antennis pedibusque anticis testaceis.

Assez allongé, brillant, pubescent de gris, vert métallique, antennes, pattes antérieures et milieu des intermédiaires testacés. Tête à ponctuation dense et rugueuse ; antennes non épaissies, assez longues ; prothorax finement ponctué ; élytres densément et peu fortement ponctués ; tibias antérieurs sinués, dilatés vers le milieu puis échancrés et amincis, intermédiaires longuement épaissis au sommet ; abdomen bicolore. Long. 5 mill. Congo : Fort Sibut.

Peut se placer près de *H. cognatus* Har., il en diffère au moins par la coloration des membres et la ponctuation du prothorax.

Laius sikkimensis n. sp. ♂. Elongatus, subnitidus, hirsutus, niger, thorace, rufo, articulis primis antennarum pro parte testaceis, elytris nigro-violaceis, flavo bifasciatis, fasciis ad suturam conjunctis.

Allongé, un peu brillant, à pubescence dressée et ponctuation mediocre sur la tête, fine et espacée sur le prothorax, forte et rapprochée sur les élytres, noir avec le prothorax testacé-rougeâtre et la base des antennes en partie testacée ; élytres flaves, ornés des dessins bleutés métalliques suivants : une bande basale, une macule postmédiane externe large, une macule apicale. Premier article des antennes assez épais, 3e très large, subarqué et non denté en arrière, creusé en avant. Long. 4 mill. environ. Indes : Sikkim.

Très voisin de *L. jucundus* Bourg., coloration plus foncée des pattes, 3e article des antennes différent, plus large, etc.

Je sépare provisoirement de cette espèce, à titre de variété sous le nom de **testaceilabris**, une ♀ indienne distincte par le devant de la tête testacée, les antennes entièrement testacées à la base et les pattes bicolores.

Hylophilus (? Vanonus) pallidimembris n. sp. Oblongus, griseo sericeo pubescens, niger, antennis pedibusque testaceis.

Oblong, finement pubescent de gris soyeux, noir avec les membres testacés. Tête tronquée postérieurement, yeux assez gros, écartés entre eux et ne touchant pas le bord pos-

térieur de la tête ; antennes longues, épaissies à l'extrémité ; prothorax un peu moins large que la tête, assez courts, à angles antérieurs nuls, impressionnés sur la base, densément ponctué ; élytres relativement courts et larges, fortement ponctués, munis d'une assez forte dépression posthumérale ; pattes intermédiaires longues, un peu arquées, postérieures courtes, un peu épaissies. Long. 2 mill. Brésil : Blumenau.

Peut se placer près de *H. latior* Pic, élytres à coloration plus foncée avec le prothorax plus large.

Hylophilus sulcithorax n. sp. Ovatus, subopacus, sericeo pubescens, nigro-piceus, capite, antennis, pedibus 4-anticis tarsisque posticis testaceis.

Ovalaire, presque opaque, revêtu d'une pubescence soyeuse, dense, en partie oblitérée sur les élytres qui offrent des fascies étroites et très sinuées noirâtres, tête, antennes, celles-ci épaisses et quatre pattes antérieures testacées. Tête subarquée derrière les yeux qui sont assez grands et éloignés ; antennes à 3e article un peu plus petit que 2e et 4e, dernier court, obliquement tronqué au sommet ; prothorax presque carré, fortement sillonné au milieu, nettement sinué postérieurement, à angles antérieurs subarrondis ; élytres en ovale court ; pattes postérieures robustes, foncées avec les tarses testacés. Long. 2 mill Iles Philippines.

A placer près de *H. Françoisi* Pic, dont il se distingue par les antennes, le prothorax sillonné et les dessins des élytres.

Hylophilus (? Euglenes) Baeri n. sp. Oblongus, sat dense griseo holosericeo pubescens, testaceus, oculis nigris, elytris ad medium brunneo fasciatis.

Oblong, assez densément pubescent de gris soyeux, testacé moins les yeux noirs, élytres ornés sur leur milieu d'une courte fascie brunâtre droite qui s'élargit sur les côtés. Tête large, subtronquée postérieurement, yeux grands, touchant presque le bord postérieur et assez éloignés entre eux ; antennes assez épaisses, à articles 2, 3 et 4 à peu près égaux, 2e épais, dernier court, obliquement tronqué au sommet ; prothorax presque carré, fortement

impressionné devant la base, à angles antérieurs arrondis ; élytres peu plus larges que le prothorax, pas très longs, à ponctuation forte, assez écartée ; cuisses postérieures peu épaissies. Long. 2 mill. Iles Philippines.

Voisin de *H. Planteni* Pic, plus densément pubescent avec les élytres ornés d'une fascie brunâtre.

Hylophilus Roberti v. nov. borneensis. Elytris diverse nigro notatis capiteque postice subarcuato a typo differt.

En plus de la tête subarquée postérieurement, le dessin des élytres est plus largement foncé et composé d'une macule humérale, d'une fascie antémédiane et d'une autre postmédiane largement jointes sur les côtés, les cuisses postérieures sont, en outre, un peu rembrunies. Bornéo : Pangaron.

Mecynotarsus subangulicollis n. sp. Subnitidus, testaceus, oculis griseis.

Un peu brillant, assez densément pubescent de gris soyeux, entièrement testacé avec les yeux gris. Prothorax fortement et subanguleusement dilaté en arrière, à corne large et longue, faiblement crenelée, crête peu marquée ; élytres assez courts, nettement atténués postérieurement. Long. 2 mill. 5. Guinée : Addah.

Diffère de *M. subparallelus* Pic, par la forme du prothorax et l'aspect moins brillant.

Mecynotarsus simplicicornis n. sp. Nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris post medium brunneo lineatis.

Brillant, modérément pubescent de gris, testacé avec les yeux noirs, élytres ornés chacun, en dessous du milieu, d'une ligne brunâtre peu distincte, remontant obliquement vers la suture. Prothorax large, corne robuste, faiblement crénelée, crête peu marquée ; élytres parallèles antérieurement. Long. 3 mill. Sénégal.

Voisin de *M. subparallelus* Pic, en diffère par la crête non bordée d'une arête distincte et le dessin des élytres.

Mecynotarsus nigronotatus n. sp. Subnitidus, testaceus, oculis griseis, elytris ad medium sat late nigro notatis.

Un peu brillant, assez densément pubescent de gris, testacé avec les yeux gris, élytres ornés vers leur milieu d'une grande macule suturale noire, rétrécie en avant ; prothorax subglobuleux, corne assez robuste et longue, crête très marquée ; élytres parallèles antérieurement, atténués en arrière. Long. 3 mill. Afrique Orientale.

Diffère de *M. dorsiger* Frm. par la pubescence plus fournie et la forme de la macule des élytres.

Notoxus peguensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, longe hispidus, testaceus, oculis griseis, elytris post medium et ante apicem nigro-piceo maculatis.

Assez allongé, orné de longs poils dressés, testacé avec les yeux gris, élytres ornés, en dessous du milieu et avant le sommet, de macules discales d'un noir de poix, suture vaguement rembrunie. Prothorax globuleux, à corne assez robuste, nettement dentelée, à dessus granuleux avec la crête indistincte, non saillante en dessus ; élytres pas très longs, subparallèles, non tronqués au sommet. Long. 4 mill. Indes : Pégu.

Peut se placer près de *N. assamensis* Krek., moins allongé avec les dessins des élytres différents.

Anthicus subdiversus n. sp. Satis nitidus, brunneus et rufescens, antennis nigris, apice testaceis.

Large, brillant, brun avec la tête, les pattes, partie des élytres, une sorte de large bande posthumérale et le sommet des élytres roussâtres ; antennes foncées avec les derniers articles testacés, celles-ci progressivement épaissies.

Tête rétrécie en arrière, finement ponctuée ; prothorax court, dilaté sur les côtés, fortement et densément ponctué ; élytres courts et larges à épaules marquées, atténués, au sommet, marqués d'une large dépression transversale avant leur milieu, à ponctuation forte et écartée ; cuisses épaissies. Long. 3 mill. environ. Brésil.

Voisin de *A. laticornis* Pic, mais antennes différentes, progressivement épaissies, prothorax à ponctuation moins dense, etc.

Anthicus compressicollis n. sp. Oblongus, nitidus, mediocre pubescens, rufus, articulo 1° antennarum, palpis pedibusque testaceis.

Oblong, brillant, médiocrement pubescent, roux avec le 1er article des antennes, les palpes et les pattes de coloration plus claire. Tête rétrécie postérieurement, finement ponctuée, yeux gris ; antennes grêles, filiformes ; prothorax assez long, peu élargi sur les côtés en avant, fortement comprimé sur les côtés postérieurement et marqué en dessus, sur la base, d'un sillon étroit, arqué en avant, à ponctuation forte et écartée ; élytres bien plus larges que le prothorax, à épaules droites, un peu élargis vers le milieu et atténués ensuite, marqués d'une dépression antérieure médiocre, à ponctuation assez forte et écartée ; cuisses peu épaissies. Long. 3 mill. environ. Brésil.

Peut se placer près de *A. invalidus* Laf. dont il se distingue par les élytres concolores, le dessus non hérissé de longs poils, etc.

Colobapsis nankineus n. sp. Nitidus, niger, elytris abdomineque testaceis, pedibus posticis testaceo maculatis.

Brillant, orné d'une pubescence grise, courte et espacée avec quelques longs poils dressés obscurs, noir avec les élytres et l'abdomen testacés, cuisses postérieures au sommet et tibias postérieurs à la base maculés de testacé. Tête assez grosse, fovéolée sur le vertex ; prothorax assez court, sinué sur les côtés, muni, près de chaque angle postérieur, d'un petit tubercule, subsillonné sur le disque, médiocrement ponctué ; élytres larges, pas très longs, à épaules saillantes et rebord sutural net, courtement rétrécis au sommet, à ponctuation pas très fine, écartée ; cuisses postérieures épaissies, biépineuses vers l'extrémité, tibias postérieurs arqués. Long. 9 mill. Nankin.

Voisin de *C. humeralis* Jac. mais prothorax entièrement noir et élytres n'ayant pas de macules humérales noires.

TABLE

POUR LE DIXIÈME FASCICULE

	Pages.
Introduction	1
Un nouveau genre de Malacodermes (avec synopsis)	3
Etude dichotomique des Hypaspistes Wat. d'Afrique . . .	6
Nouveaux Coléoptères de diverses familles	7